La Guinée Bissau : Homme et Nature en Harmonie

Petit guide écotouristique d'interprétation de l'environnement

Féron E.
Corréard B.
Montagut J.J.
Medina K.
Watson E.
Baldwin A.

Mai 1998

IUCN
1998
070

USAID

DDC UICN
Union mondiale pour la nature

Avant de lire vos Eco-Fiches de Guinée Bissau

En faisant ces "Eco-Fiches", notre intention était de fournir aux visiteurs arrivant en Guinée Bissau un document qui les aiderait à mieux comprendre la diversité des caractéristiques naturelles et humaines qui font que ce pays est unique.

Nous ne voulions pas faire un guide de plus sur les animaux, les oiseaux, les coutumes et la cuisine locales mais plutôt un compagnon de voyage qui pourrait s'adapter à vos souhaits et votre fantaisie du moment. C'est pour cela que nous avons choisi le principe des fiches qui peuvent être classées librement et mélangées à volonté. En fait, ces fiches sont particulièrement pratiques parce qu'elles peuvent être utilisées de nombreuses manières. Vous pouvez écrire vos propres notes au dos, les afficher, les envoyer comme des cartes postales, les garder en souvenir, les offrir, sélectionner celles qui conviennent à telle ou telle visite, etc.

Nous souhaitions que ces fiches soient agréables à regarder et à toucher afin d'attirer l'attention et servir d'ambassadrices de la Guinée Bissau quand vous les ramènerez dans votre pays. Les compliments que recevons nous permettent d'être satisfaits de notre travail. Ceci d'autant plus que tout, de la conception à l'impression, a été fait en Guinée Bissau avec le matériel et le personnel disponibles.

Nous espérons que ce petit guide rendra votre séjour encore plus agréable

Pour davantage d'informations :
UICN
AP 23 Bissau codex 1031
Guinée Bissau, Afrique

Le produit de la vente de ces fiches sera utilisé pour en produire de nouvelles

Consultez les Eco-Fiches sur Internet à www.uicn.org, à la page Guinée Bissau et à www.bissau.net.

Disponibles également en anglais

IUCN
1998
070

Les Eco-Fiches sont pleines d'informations !

Le numéro correspond à un endroit sur la carte.
Il est aussi mentionné dans le texte d'autres
fiches qui y font référence

Le sujet traité par la fiche

La région concernée

Le thème de la fiche

Un texte intéressant, adapté
à la Guinée Bissau et à la
zone que vous visitez, qui
contient des informations
que vous ne trouverez
nulle part ailleurs !

Tous les thèmes traités
par les fiches :
Plantes, mammifères, gens,
oiseaux, poissons, reptiles,
insectes

Qui a fourni le financement et
le travail nécessaires pour
produire ces fiches

Caïlcedrat

Photographies U. et H.-J. von Maydell

Créole :	*Bissilom*
Foula :	*Polmagos*
Famille :	*Meliaceae*
Nom sc. :	*Khaya senegalensis*

Distribution

savanes et forêts

Description

Ce bel arbre est présent le long de hombreuses routes du pays. Arbre atteignant 35 m, au fût sans branche jusqu'à plus de 10 m, d'un diamètre dépassant 1 m. Immense cime. Pas de racine en contrefort. Ecorce brunâtre à gris foncé, écailleuse, à tranche rouge, exsudant un peu de liquide rougeâtre. Fruits : capsules ligneuses globuleuses de 5 à 10 cm de diamètre, qui éclatent en 4 lobes avec chacun une pile de graines.

Utilisations

Menuiserie/Ebénisterie : le bois se compare tout à fait au véritable acajou américain. A l'état frais, il est rouge brun clair, mais il fonce rapidement. Le bois sèche et se travail facilement. Il donne une très belle surface, même laqué. On l'emploie en bois massif pour les meubles, les cadres de fenêtres et de portes, les mortiers.

Médecine : *Ecorce* : utilisée sous forme de décoction et d'infusion dans de l'eau froide, contre la fièvre. La décoction ou la pulpe de l'écorce avec du miel, est un médicaement purgatif utilisé contre les troubles des menstruations et comme abortif. Egalement utilisée pour traiter le paludisme (idem graines), la syphilis, les troubles gastriques et comme vermifuge.

Feuilles : utilisées sous forme de décoction et appliquées sur les plaies et ulcères.

Vène

Créole :	*Po di Sangue*
Foula :	*Bani*
Famille :	*Fabaceae/ Papillonaceae*
Nom sc. :	*Pterocarpus erinaceus*

Distribution

savanes forestières

Description

Arbre de 12 à 15 m de haut avec un fût droit et une couronne ovale ou ronde projetant peu d'ombre. Ecorce brune noireâtre, très écailleuse exsudant une résine rouge translucide (justifiant l'appelation "Paû de Sangue") qui durcit vite à l'air. Rameaux très pubescents.

Utilisations

Menuiserie/Ebénisterie : Bois rouge brun, très dur, résistant aux termites, très durable, utilisé dans la construction des maisons, usage ménager et agricole, confection de xylophones et de masques.

Médecine : *Ecorce* : la décoction de l'écorce, astringente, est utilisée contre la dysenterie et les troubles urinaires. Brûlée, pulvérisée et appliquée sur les plaies, elle favorise la cicatrisation. Séchée et pulvérisée avec la noix de cola, elle est prescrite comme fortifiant pour le rétablissement après les maladies graves.
Feuilles : utilisées en infusion/lotion pour le traitement de la fièvre.

Divers : La sève fournit en séchant une résine rouge ("Kino") qui, pulvérisée, sert à satiner les étoffes. Le bois des racines et du tronc fournit aussi des colorants.

Mimosa pourpre



Photographies U. et H.-J. von Maydell

Nom courant : *Mimosa pourpre*
Créole : *Faroba*
Foula : *Nere*
Famille: *Mimosaceae*
Nom sc : *Parkia biglobosa*

Distribution

savanes forestières

Description

Grand arbre de 15 à 20 m de hauteur, avec une large cime étalée en parasol. Floraison et maturité des fruits ont lieu pendant la saison sèche. On reconnaît alors facilement les boules de fleurs rouges ou oranges suspendues à de longs pédoncules (jusqu'à 30 cm).
Fruits : longues gousses d'environ 45 cm, suspendues en grappes aux réceptacles des fleurs en forme de massues. Ces gousses s'ouvrent à maturité sur l'arbre et contiennent de nombreuses graines noires, aplaties, enrobées dans une pulpe riche en saccharose.

Utilisations

Médecine : *Ecorce* : la décoction de l'écorce est utilisée dans les bains contre la fièvre et la jaunisse; dans l'eau chaude utilisée contre les maux de dents. L'écorce mélangée avec le jus de citron est utilisée pour le traitement des plaies et des ulcères.

Fruits : ont une action antidiurétique, utilisés en Europe comme alimentation diététique. La pulpe des fruits, préparée avec du miel est une boisson fébrifuge pour les enfants. Les fruits non mûrs provoquent en revanche des coliques violentes.

Alimentation : La pulpe fraiche est douce (jusqu'à 60 % de sucre) et comestible; fermentée, elle constitue une boisson rafraîchissante. Les graines, riches en sucre et matières protéiques, constituent dans certaines zones un aliment important.

Kinkéliba

Photographies U. et H. J. von Maydell

Créole : *Buco*
Foula : *Kenkeliba*
Famille: *Combretaceae*
Nom sc. : Combretum micranthum

Distribution

Savanes et forêts. Forme souvent des peuplements purs denses. Sa présence indique des sols très défavorables, incultivables.

Description

Arbuste ou arbre atteignant 10 m de hauteur, dont les rameaux rouge brun s'élancent sur leur support jusqu'à 20 cm. Feuilles vert clair vif dans la jeunesse, devenant typiquement rouille, visibles de loin pendant la saison sèche. Fruit : rouge brun à 4 ailes de 12 à 14 cm de diamètre.

Utilisations

Alimentation : les feuilles sont utilisées dans beaucoup de pays comme thé rafraîchissant, mélangé avec beaucoup de sucre.

Divers : fournit bois de chauffe et charbon de bois. Pousses utilisées pour la construction des huttes, le tressage des corbeilles, la confection de lits...

Médecine : plante recommandée contre la maladie appelée "fièvre de l'eau noire" et qui se manifeste par l'apparition de sang dans l'urine

Feuilles : utilisées en infusion pour le traitement de la fièvre bilieuse et des troubles du foie.

Fruits : pulvérisés avec de l'huile, servent de pommade pour les enflures et les abcès d'origine syphilitique.

Racines : utilisées en infusion comme fébrifuge, en décoction comme lotion contre la fièvre et le lumbago.

Baobab

Photographies U.- et H.-J. von Maydell

Créole :	*Cabacera*
Foula :	*Boé*
Famille :	*Bombaceae*
Nom sc. :	*Adansonia digitata*

Distribution

Régions subhumides et semiarides. Ne pousse pas en forêt tropicale humide (Cantanhez).

Description

Arbre au tronc immense (jusqu'à 6 m de diamètre et 30 m de hauteur), aux branches puissantes ressemblant à des racines (ce qui accrédite les croyances africaines que l'arbre tire grâce à elles sa force du ciel). Les jeunes arbres ressemblent à des bouteilles élancées, dans les bouchons desquelles on aurait piqué les rameaux. Arbre dénudé en saison sèche. Tronc exsudant de la gomme. Ecorce tendre. Fleurs de 15 à 20 cm de diamètre suspendues à des ficelles (jusqu'à 1 m de longueur) qui supportent plus tard le fruit. Pollinisation : principalement par les chauve souris qui vont de fleur eu fleur se nourrissant de nectar.

Utilisations

Plus de 30 utilisations répertoriées dont voici quelques exemples :

Alimentation : *Feuilles* : fraîches = excellent légume, séchées et moulues = grédient de nombreuses sauces (riches en calcium et fer).

Pulpe des fruits (pressée ou séchée), avec de l'eau = boisson rafraîshissante (riche en vitam. B1 et C).

Divers : fourrage pour le bétail (feuilles), tressage (fibres de l'écorce), teinture rouge (racines).

Médecine : *Ecorce* : substitut de la quinine dans le traitement du paludisme (matière active : adansonine).

Feuilles : séchées et pulvérisées accélèrent la respiration et préservent des troubles des reins et de la vessie. En décoction utilisées contre les maladies des yeux et des oreilles. Triturées, utilisées contre l'inflammation cutanée suite à la morsure d'insectes.

Graines : une décoction des graines roties sert à traiter la dysenterie et les mêmes graines pulvérisées sont utilisées contre les maux de dents.

Lingué



Illustration CTFT, modif. B. Corréard

Créole : *Po di Conta*
Foula : *Lengué*
Famille: *Caesalpinaceae*
Nom sc. : *Afzelia africana*

Distribution

Arbre de transition entre la forêt sèche et la forêt humide (Cantanhez). Présents des forêts denses sèches aux forêts claires.

Description

Grand arbre au fût assez droit. Couronne formée de branches tortueuses. Ecorce brun rougeâtre ou jauneâtre. Tranche épaisse de 1 cm environ, de couleur jaune brun moucheté de blanc. Les fleurs sont mangées par les roussettes (grandes chauves souris). Fruit : gousse épaisse caractéristique à grosses graines noires oblongues. La plante est traditionnellement considérée comme un arbre mystique et souvent choisie comme arbre à palabre.

Utilisations

Menuiserie/Ebénisterie : Bois à grain grossier séchant sans se déformer ni se fendre, mais lentement. Bois dur et lourd devenant rouge à la lumière. Utilisé pour les constructions lourdes et durables : ponts et ouvrages portuaires, construction navale, traverses, menuiserie d'extérieur particulièrement exposée aux intempéries.

Médecine : L'arbre présente de nombreux usages en médecine locale (traitement de la fièvre, des maux de ventre, de la dysenterie, de l'asthme, de la bronchite, de l'hypertension, de la maladie du sommeil, du tétanos, de la lèpre). Les graines sont en revanche un poison violent.

La Culture du Palmier à huile


Photographies : Tiniguena, F. Malaisse et B. Corréard

Distribution

Le palmier à huile (créole : palmeira denden, foula : tchebe) très répandu dans toute la zone tropicale humide d'Afrique est une des rares espèces de plantes alimentaires originaires d'Afrique .

Utilisations

Les fruits du palmier à huile (rouges, de 2 à 5 cm de long) se présentent sous forme d'une grosse grappe unique sur chaque arbre. Ils permettent d'obtenir :

Huiles : - *huile de palme*, de couleur rouge, est extraite du mésocarpe du fruit pulpeux par chauffage/pillage. Cette huile rouge est très riche en acides palmitique (acide gras saturé), oléique et linoléique (insaturés), ainsi qu'en vitamine A. L'huile de palme n'est pas consommée seule mais elle constitue la sauce ("chabeu") qui accompagne les aliments riches en amidon, notamment le riz (fiche 9). Fait l'objet d'un commerce important en Guinée Bissau, mais aussi avec le Sénégal et la Gambie.

- *huile de palmiste*, incolore, est extraite de la graine elle même qui est enfermée dans un endocarpe très dur qui doit être fendu et pressé. Les villageois ne possédant traditionnellement pas de pressoir, les graines sont parfois vendues à des entrepreneurs de trituration.

Dans le monde, les principaux pays producteurs sont : Nigéria, Zaïre, Indonésie, Malaisie, Côte d'Ivoire. Les principaux utilisateurs sont : Etats unis d'Amérique, Royaume Uni, France, Allemagne, Italie.

Vin de palme (ou "malafu") : issu de la fermentation de la sève receuillie à la base des inflorescences mâles et femelles après les avoir incisées. Si sa fermentation n'est pas trop avancée, le vin de palme constitue une boisson nutritive riche en vitamine B. La production du vin de palme est exceptionnelle en région musulmane, à cause des interdits religieux. Elle est traditionnellement l'oeuvre des ethnies pepels et mandjakes (fiche 24).

Corubal
Guinée-Bissau

La culture de l'anacardier

8

Photographie B. Corréard

Distribution

L'anacardier (créole : Catjú, foula : cajudje) est une plante alimentaire originaire du littoral atlantique de l'Amérique du Sud (Brésil, Antilles).

Economie

Au cours des 20 dernières années, le gouvernement de Guinée Bissau a largement encouragé la culture de rente de la noix de cajou destinée à l'exportation. Aujourd'hui le pays peut se prévaloire d'être le 4ème producteur africain (derrière le Mozambique, la Tanzanie et le Kenya) avec une production annuelle de 20 000 tonnes de noix.
La noix de cajou représente ainsi la 2ème ressource du pays après la pêche industrielle. Pourtant, ces bons résultats ne doivent pas occulter les problèmes liés à cette production:

1. anacardier = marqueur de propriété foncière (fiche 19)
2. dévaluation constante de la noix de cajou

ex : en 1987 dans la région de Bambadinca, 1 kg de noix s'échangeait contre 2 kg de riz; aujourd'hui il faut 2 kg de cajou pour 1 kg de riz

3. noix de cajou de Guinée Bissau d'une qualité inférieure à celle de ses concurrents

Utilisations

Le fruit de l'anacardier ("noix de cajou") est suspendu à un pédoncule renflé en forme de poivron rouge ou jaune ("pomme de cajou") :

- *Noix de cajou* : grillée sur feu ouvert ou dans l'huile, elle constitue un aliment savoureux
- *Pomme de cajou* : riche en vitamine C, elle est consommée séchée (comme la figue), en boissons ou confitures. Permet également de fabriquer un alcool très fort, "l'alcool de cajou".

DDC UICN
Union mondiale pour la nature

Le riz chez les populations islamisées



Le riz, cultivé dans tout le pays, est la principale culture vivrière en Guinée Bissau. Il convient de distinguer :

1. le riz pluvial de plateau pratiqué par les populations islamisées foulas et mandingues (fiche 24)
2. le riz de "Bolanhas" :

- riz de mangrove pratiqué par les Balantes (fiche 24), population animiste
- riz de "Bolanha de água doce" (eau douce) de bas-fonds au niveau des "Lalas" (savanes herbacées humides) pratiqué par les populations foulas et mandingues

La culture de riz de plateau (ou riz "pam-pam") exerce une forte pression sur l´environnement car elle nécessite un défrichement important (1). En outre, le riz est une plante très exigeante qui tend à épuiser rapidement les sols.

Or, si les rendements en riz sont satisfaisants, la culture sur la même parcelle est fréquemment pratiquée pendant 3 ou 4 ans de suite. Ces itinéraires agricoles dégradants doublés bien souvent de temps de jachère (action de laisser le sol sans culture pendant une période plus ou moins longue afin de reconstituer ses réserves) très réduits ne font qu'appauvrir les sols et les rendre rapidement impropres à toute culture à venir. Rendements en riz : 300-800 kg/ha.

La culture du riz de bas-fond (2) peut être une très bonne alternative aux rizières de pam-pam, dans la mesure où elle permet :

- de cultiver sur les mêmes parcelles jusqu'à 15 ans de suite
- d'obtenir des rendements en riz importants (2000-2500 kg/ha)

Pourtant, cette culture est confrontée à de sérieux problèmes venant de l'amont, à savoir <u>des plateaux</u> :

- asphyxie hydrique par ruissellement d'eau de pluie depuis les terres défrichées des plateaux
- asphyxie par sédimentation de sable dans les bas-fond (par le mécanisme précédemment cité)

Ainsi, la gestion des rizières de plateaux et celle des rizières des bas-fond doivent nécessairement se faire de façon conjointe en vue d'optimiser les rendements en riz tout en permettant une protection raisonnée des ressources naturelles.

Le Patrimoine forestier en péril

Photographie B. Correard

L´exploitation forestiére est le principal et quasiment le seul secteur industriel de la Guinée Bissau. La capacité de régénération des forêts est malheureusement inféneure au seuil théorique d´exploitation.

Les menaces sur la forêt sont nombreuses:

1. la pression démographique
2. le développement des cultures de rente (noix de cajou (fiche 8), mangues...)
3. la stérilisation des terres de "bolanhas" par acidification ou salinisation
4. L'extension des surfaces cultivées grâce à la culture attelée
5. les attributions de concessions foncières et l'installation de nouveaux "ponteiros"
6. l'extension des surfaces cultivées en riz pluvial (fiche 9)
7. le besoin croissant de charbon de bois pour l'approvisionnement des villes

Outre la perturbation des écosystémes du pays (rareté accrue des pluies dans certaines zones par exemple, à l'instar du Sénégal), les difficultés de régénération des nappes phréatiques en saison sèche, l'accroissement des problèmes irrémédiables d'érosion des sols, la dégradation de la forêt conduira à la disparition d'essences d'arbres caractéristiques de Guinée Bissau. Les espèces les plus menacées sont *Khaya senegalensis* (fiche 1), *Pterocarpus erinaceus* (fiche 2) *Afzelia africana* (fiche 6) et *Borassus aethiopium.*

Ainsi, l'écotourisme peut contribuer à la conservation du patrimoine forestier de Guinée Bissau :

1. en permettant une sensibilisation des populations locales sur l'utilisation "non consommatrice" des ressources forestières
2. en servant de trait d'union entre les différents acteurs de l'économie du pays (professionnels, touristes, organismes de protection de la nature...)



Corubal
Guinée-Bissau

Babouin de Guinée

11


Photographie Kol Medina

Créole : *Macaco cao*
Nom sc. : *Papio cynocephalus*

Description

Longueur tête-queue : 50-110 cm
Poids : 15-35 kg **Gestation** : 6-7 mois

Animal actif le jour, dort sur un rocher ou un arbre la nuit. Espèce abondante en Guinée Bissau, particulièrement dans les régions de Gabu, Bafata et les zones de forêts (berges du Rio Corubal, Cantanhez). Apparemment absent de la région de Cacheu et du parc national de Casamance. N'est pas chassé dans les régions musulmanes à cause des interdits religieux, mais est tué pourtant, à l'occasion, pour défendre les cultures (dévoré par les chiens). Vit en clan. Pendant les déplacements, les jeunes mâles marchent en premier, suivis par les femelles, les petits et enfin les vieux mâles avec les mères et les tout petits. A l'annonce d'un danger les vieux mâles vont au devant et se battent, bientôt suivis par tous les autres mâles adultes. Le babouin est un redoutable adversaire car il est agressif et a de fortes canines. Ouïe et vue excellentes (voit les couleurs), odorat fin. Prédateurs : Panthère principalement, plus rarement Lion, Lycaon, Crocodile, Python.

Alimentation

Omnivore. Graminées, plantes herbacées, racines, bulbes, graines, feuilles, fruits, écorces, plantes cultivées, insectes, araignées, crustacés, oeufs, lézards, jeunes antilopes, autres singes, cannibale à l'occasion.

Voix

Vaste répertoire :
1. aboiement très fréquent (avertissement, excitation)
2. grognements fréquents (satisfaction, avertissement)
3. "ouak ouak" (satisfaction intense)
4. "ooo ooo" des jeunes (faim, satisfaction, jeux)
5. "ik ik"(étonnement)
6. cris stidents (peur)

Traces

DDC UICN
Union mondiale pour la nature

Patas

Photographie Kol Medina

Créole : *Sancho Fula*
Nom sc : *Erythrocebus patas*

Description

Longueur tête-queue : 50-75 cm
Poids : 4-13 kg
Gestation : 170 j

Animal actif surtout le matin et le soir, dort la nuit. Espèce abondante en Guinée Bissau, dans le même habitat que le Babouin de Guinée (fiche 11) : savanes et forêts claires. Pourtant les deux espèces s'y sont adaptées de manières différentes et ne se mélangent jamais. On le rencontre fréquemment le long des routes. Evolue parfois avec le singe vert (fiche 13). Vit à terre, dans les herbes. Ne monte dans les arbres que pour dormir et faire le guet. Vit en clan de 6 à 30 individus guidés par la femelle dominante. En cas de danger les petits sont momentanément cachés dans les herbes. Court très vite (50 km/h). Ouïe et vue excellentes, odorat assez fin. Prédateurs : leopard, hyène (fiche17), aigle couronné.

Alimentation

Fruits, graines, feuilles, pousses, racines, arachides dans les champs, insectes, petits lézards et oiseaux, oeufs, terre riche en minéraux, boit peu.

Voix

Par nature silencieux, mais :
1. "ooo ooo ooo" crié la gueule fermée (surprise)
2. "aa aa aa" sec (inquiétude)
3. gazouillement et sifflement de plaisir
4. "mouou" faible (signal de contact)
5. "oé" des jeunes (désir)
6. série d'aboiements (menace du mâle adulte).

Traces



Corubal
Guinée-Bissau

Vervet

Photographie
Kol Medina

Créole : *Sancho* preto
Nom sc. : *Cercopithecus aethiops*

Description

Longueur tête-queue : 40-83 cm
Poids : 3.4-7.7 kg **Gestation** : 175-203 j

Animal actif le jour, dort sur un arbre la nuit. Espèce abondante en Guinée Bissau, y compris sur certaines îles de l'archipel des Bijagos. Affectionne les forêts claires, les savanes et les mangroves. Vit en groupe (généralement familial) de 6-60 individus. Pendant la journée plusieurs groupes peuvent se rassembler. Agressivité plus forte entre membres de différents groupes qu'au sein d'une même famille. Se déplace souvent à terre pour se nourrir et vient fréquemment dans les champs et les plantations où il fait de gros dégâts. Grimpe bien, fait de grands bons d'un arbre à l'autre, nage bien.
Prédateurs : leopord, serval, babouin, caracal, crocodile, aigle couronné, python.

Alimentation

Fruits, fleurs, bourgeons, pousses, écorces, sèves, graines d'herbe, récoltes, insectes, araignées, lézards, oeufs d'oiseaux, oisillons.

Voix

Par nature assez calme, mais :
1. cri territorial du mâle assez sec "kek kek kek"
2. pépiements et gazouillis
3. cris d'inquiétude

Traces



Potamochère

0 5cm

Créole : *Porco Vermelho*
Nom sc. : *Potamochoerus porcus*

Description

Longueur tête-queue : 100-150 cm **Poids** : 70-80 kg **Gestation** : 120 j

Animal plutôt nocturne. Présent en abondance dans toute la Guinée-Bissau et plus particulièrement en zone de forêt claire (parc naturel de Cacheu), ou dense (Cantanhez). Plus rare en savane ouverte (zone de Boé). Endommage fréquemment les cultures en retournant la terre pour manger racines et tubercules, et est de ce fait considéré comme nuisible. Chassé pour sa viande autant par les villageois que par les chasseurs sportifs (pendant la période de la chasse, présent au menu de nombreux restaurants et campements). Vit généralement en groupe de 6-12 individus conduits par un grand mâle. Présence de vieux individus mâles solitaires. Possède une ouïe fine et un excellent odorat. Prédateurs habituels : leopard et lion.

Alimentation

Racines, bulbes, graines, fruits, herbes, champignons, reptiles, insectes, oeufs d'oiseaux, charognes.

Fèces

Etant omnivore ses fèces contiennent des restes de diverses substances organiques. Deviennent sombres avec l'âge.

Traces

Proches de celles du Phacochère, mais plus circulaires. 5-7 cm de long.

Photographie Kol Medina

Corubal
Guinée-Bissau

Phacochère

0 5cm

Créole : *Porco de mato*
Nom sc. : *Phacochoerus aethiopicus*

Description

Longueur tête-queue : 125-150 cm
Poids : 68-95 kg
Gestation : 160-170 j

Animal actif le jour. Présent en abondance dans toute la Guinée-Bissau, mais évite les forêts, la végétation dense et les pentes escarpées. Endommage plus rarement les cultures que le Potamochère (fiche 15); néanmoins considéré comme nuisible. Chassé pour sa viande à l'instar du Potamochère. Possède un esprit gréraire. Partage souvent son domaine vital avec d'autres groupes. Le mâle défend la famille avec ses canines. Présence de vieux mâles solitaires. Odorat et ouïe prédominants. Vue meilleure que celle du Potamochère. Prédateurs habituels : lèopard et lion.

Alimentation

Herbes courtes, racines, fruits, écorces tendres, insectes, petits animaux, charognes.

Fèces

En forme de boule, de couleur marron verdâtre.

Traces

4 doigts à chaque patte. Les doigts latéraux ne touchent pas terre (comme pour le Potamochère). La trace ressemble à celle du potamochère, mais est plus mince et plus pointue vers l'avant.



Guib harnaché

Créole : *Gazela pintada*
Nom sc. : *Tragelaphus scriptus*

Description

ongueur tête-queue::115-150 cm
Poids : 32-64 kg
Gestation : 200 j

Animal actif tôt le matin et tard le soir jusqu'à la première moitié de la nuit. Le guib harnaché est l´espèce de mammifère la plus répandue en Guinée-Bissau. Présent partout, même dans les zones à prédominance urbaine et agricole. Gibier très prisé pour sa viande; subit de ce fait une chasse intensive dans certaines régions. Nage bien et saute les clôtures jusqu'à deux mètres. Est très sédentaire. Les deux sexes sont solitaires. La femelle vit en famille avec son petit et un autre jeune plus âgé. Animal souvent en compagnie de babouins (fiche 11). Odorat et ouïe (grandes oreilles) fins, vue moins bonne. Prédateurs habituels : serval, hyène (fiche 17), léopard, plus rarement lion et crocodile.

A Samba Loba, depuis janvier 1998, un petit projet de réintroduction de guib harnachés a étéê mis en route. Les animaux obtenus chez des particuliers à Bissau sont visibles dans l´enclos temporaire.

Alimentation

Animal brouteur se nourissant de feuilles, bourgeons, pousses et fruits d'arbustes, plantes herbacées, légumes, fleurs, écorces de citrus. Lèche les terres salées et chargées de minéraux.

Fèces

En forme d'amas, souvent collés les uns aux autres.

Traces



Corubal
Guinée-Bissau

Petit Martin Pêcheur huppé

Photographie G. Grépin

Créole : -
Nom sc. : *Alcedo cristata*

Description

Longueur : 12 cm
Sexes : semblables

Immédiatement reconnaissable grâce à sa très petite taille et à son dos bleu. Peut être confondu avec le Martin-chasseur pygmée (fiche 26), mais est pourvu d'un bec moins aplati et plus long que ce dernier. Possède un trait blanc sur les côtés du cou, marron. Sa tête, bleue, est surmontée d'une huppe érectile (à la différence du Martin-chasseur pygmée) de plumes bleues aux rayures noires. Se tient généralement perché sur une branche basse ou un roseau au dessus de l'eau.

Habitat

Fréquent dans tous les points d'eau, de la petite mare aux grands fleuves. En revanche, rarement présent près des cours d'eau forestiers (Rio Cacine).

Nidification

4-5 oeufs déposés dans un terrier creusé généralement dans une berge.

Voix

Pépiement aigu assez peu sonore ("tip") émis au ras de l'eau.



Ombrette

Photographie E. Féron

Créole : *Kacu-martel*
Nom sc. : *Scopus umbretta*

Description

Longueur : 60 cm **Sexes** : semblables

De couleur brune terne. La tête est prolongée à l'arrière par une huppe qui lui donne une forme d'enclume typique. Est plutôt court sur pattes. Peu sauvage. Possède un vol léger.

Ces oiseaux sont souvent représentés dans le folklore des peuples d´Afrique. Les Mandingues expliquent la forme de la tête de la maniére suivante: quand la toute première ombrette est morte, son fils, refusant de la perdre à tout jamais, ouvrit l´arriére de sa tête et y déposa le corps de sa défunte mére.

Habitat

Affectionne les marais, les rizières, les berges de fleuve et les mangroves.

Nidification

4-5 oeufs blancs. Le nid sphérique et d'un diamétre d'environ 1 m est fait de branchages. Il est traditionnellement placé dans une enfourchure et parfois dans un jardin.

Voix

Sorte de caquetage bruyant, de tonalité élevée.

Vautour palmiste

Photographie D. Cyrus

Créole : -
Nom sc. : *Gypohierax angolensis*

Description

Longueur : 58 cm **Sexes** : semblables

De couleur blanche; ailes blanches et noires, large bande noire sub-terminale sur la queue (à ne pas confondre avec l'aigle pêcheur qui a la queue blanche et le dos noir). De couleur brune lorsqu'il est jeune. Cire et tour de l'oeil orange. Se perche dans les arbres souvent bien en vue, seul ou par 2 ou 3. Peu sauvage.

Habitat

Généralement près de l'eau. Sa présence est conditionnée par la répartition du palmier à huile (fiche 7) dont il mange les fruits (d'où son appellation de Vautour palmiste).

Nidification

1-2 oeufs blancs tachetés. Le nid, volumineux, est perché sur un arbre élevé.

Voix

Sorte d'aboiement assez fréquent.

Ignicolore

Photographie E. Féron

Créole :	-
Anglais :	*Red bishop*
Nom sc. :	*Euplectes oris*

Description

Longueur : 12 cm **Sexes** : mâle rouge écarlate et noir

De couleur rouge; ventre, couronne et côtés de la tête noirs. Ailes brunes, tout comme la queue qui, cachée derrière les rémiges caudales apparaît rouge. Parfois les mâles peuvent être oranges au lieu de rouge. Pendant la reproduction, les Ignicolores mâles se tiennent en évidence au sommet des herbes. Le vol nuptial est bondissant.

Habitat

Fréquente les plaines à hautes herbes, les régions agricoles de plateaux (affectionne les champs de mil et de riz) comme la région de Bambadinca, les zones innondables ("lalas").

Nidification

2-3 oeufs d'un bleu assez foncé, parfois parsemés de points. Le nid est généralement tissé en forme de boule avec une entrée latérale, et accroché aux herbes hautes.

Voix

Gazouillis peu typique.

Martin-chasseur pygmée


Photographie W.R. Tarboton

Créole : -
Nom sc. : *Ceyx picta*

Description

Sexes : semblables

A peine plus petit que le petit Martin-pêcheur huppé (fiche 21). Ventre rouge orangé, huppe (non érectile) et ailes bleues striées de noir. Côtés de la tête violets. Souvent loin de l'eau, perché sur une branche. Peut néanmoins saisir des insectes à la surface de l'eau.

Habitat

De la savane arbustive aux forêts dont il occupe les clairières.

Nidification

3-4 oeufs déposés dans un terrier creusé dans un talus ou une termitiére.

Voix

Petit cri aigu.

Corubal
Guinée-Bissau

Aigle pêcheur

Créole : -
Nom sc. : *Haliaetus vocifer*

Description

Longueur : 65-75 cm

Sexes : semblables, mais femelle plus forte

Poitrine blanche; abdomen châtain, queue blanche et dos noir. En comparaison, le vautour palmiste (fiche 23) a les parties inférieures entièrement blanches et la queue barrée de noir. De couleur brune quand il est jeune (difficilement reconnaîssable).

Habitat

Près des cours d'eau, de la petite mare au grand fleuve.

Nidification

2 oeufs blancs. Le nid de grande dimension est construit non loin de l'eau, souvent à faible hauteur. Il est réutilisé chaque année par le même couple d'aigles pêcheurs.

Voix

"kiou (bref arrêt) kiou-kiou-kiou" sonore et de tonalité élevée.


Corubal
Guinée-Bissau
N
La région de Sinchá Canta
Pate Baliel
Sinchá Lali
Sinchá Mamadu
Demba
Sinchá Canta
Cansamange
Campement de
Samba Loba
1
2-3-7
4
6
8
9
10
11-12-13
15
16
18
21-22-23-25-26-27
1 km
Rio Corubal
10 No Fiche
Savane herbacée humide ("lalas")
Forêt sèche claire
Chemins
Terres cultivées
Cours d'eau
Terres en jachère/susceptibles d'être cultivées
DDC UICN